投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　2時間15分

胃　CapeOX(XELOX)

クールの概要

3週間で1クール
第1日目に投与。ゼローダは2投1休

1クール　1　8　15　2クール　22　(DAY)

	種別	薬剤		用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓									↓			
②	側管1	ﾃﾞｷｻｰﾄ ｱﾛｷｼ 生食	9.9mg 0.75mg 50mL	点滴	15分	↓									↓			
④	側管3	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	130mg/m2 250ml	点滴	120分	↓									↓			
		ゼローダ	2000mg/㎡ 日	内服	2投1休													

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 5時間　　分

胃CPT11+CDDP

クールの概要

4週間が1クール
DAY1･15に投与

1クール　　2クール
1　8　15　22　29　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓				↓					↓			
②	側管1	アロキシ デカドロン 生食	0.75mg 9.9mg 50mL	点滴	15分	↓				↓					↓			
③	側管2	イリノテカン 5%ブドウ糖	60mg/m2 250ml	点滴	90分	↓				↓					↓			
④	側管3	シスプラチン 生食	30mg/㎡ 500ml	点滴	90分	↓				↓					↓			
⑤	メイン	ソリタT3 プリンペラン	500ml 10mg	点滴	90分	↓				↓					↓			
		ソリタT3	1000mL	点滴	2時間		↓				↓							

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間: 1時間 45 分

胃 CPT11-2W

クールの概要

5週間が1クール
DAY1･15に投与。DAY8･22･29は休薬

1クール　2クール
1　8　15　22　29　36　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓				↓					↓			
②	側管1	アロキシ デカドロン 生食	0.75mg 9.9mg 50mL	点滴	15分	↓				↓					↓			
③	側管2	イリノテカン 5%ブドウ糖	150mg/m2 250ml	点滴	90分	↓				↓					↓			

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　1時間　45分

胃 CPT11-w

クールの概要

5週間が1クール
DAY1･8･15･22に投与。DAY29は休薬

1クール　2クール
1　8　15　22　29　36　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓		↓		↓		↓			↓			
②	側管1	アロキシ デキサート 生食	0.75mg 9.9mg 50mL	点滴	15分	↓		↓		↓		↓			↓			
③	側管2	イリノテカン 5%ブドウ糖	100mg/m2 250ml	点滴	90分	↓		↓		↓		↓			↓			

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　　時間　　分

胃 DCS

クールの概要

4週間が1クール

1クール　　2クール

1　2　3　4　5　14　28　29　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間	1	2	3	4	5					29			
①	メイン	生食	100ml	点滴	CDDP 終了まで	↓									↓			
②	側管1	フィジオ140	500ml	点滴	60分	↓									↓			
③	側管2	プロイメンド 生食	1V 500ml	点滴	60分	↓									↓			
④	側管3	デキサート アロキシ 生食	9.9mg 0.75mg 50ml	点滴	15分	↓									↓			
⑤	側管4	ドセタキセル 5%ブドウ糖	40mg/m2 250ml	点滴	60分	↓									↓			
⑥	メイン	マンニットール	300ml	点滴	30分	↓									↓			
⑦	側管5	シスプラチン 生食	60mg/m2 500ml	点滴	120分	↓									↓			
		フィジオ140	500ml	点滴	1～2時間	↓										↓	↓	↓
		フィジオ140	1000ml	点滴	8時間	↓										↓	↓	↓
		フィジオ140 デキサート	500ml 6.6mg	点滴	4時間		↓	↓	↓							↓	↓	↓
		フィジオ140	500ml	点滴	4時間					↓								
		フィジオ140 プリンペラン	1000ml 20mg	点滴	8時間		↓	↓	↓	↓								
		TS-1	80mg/m2	内服	2投2休													

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間：1時間30分

胃 DS

クールの概要

3週間が1クール。DAY1に投与。
TS-1はDAY1から14まで投与。3週目休薬。

1クール　　2クール
1　　8　　15　　22　（DAY）

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓									↓			
②	側管1	デキサート	6.6mg	点滴	15分	↓									↓			
③	側管2	ドセタキセル 5%ブドウ糖	40mg/m2 250ml	点滴	60分	↓									↓			
④		TS-1	80～120mg /日	内服	2投1休													

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　3 時間　45分

胃　G-SOX+HER

クールの概要

3週間が1クール
第1週目にオキサリプラチン投与
DAY1～14にTS-1投与

1クール　2クール
1　8　15　22　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓									↓			
②	側管1	トラスツズマブ 生食	8mg/kg 250mL	点滴	90分	↓												
④	側管3	トラスツズマブ 生食	6mg/kg 250mL	点滴	90分										↓			
		ﾃｷｻｰﾄ ｱﾛｷｼ 生食	9.9mg 0.75mg 50ml	点滴	15分	↓									↓			
		ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ 5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖	100mg/㎡ 250ml	点滴	120分	↓									↓			
		TS-1	80～120mg /日	内服	1日2回													

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　2 時間　15分

胃　G-SOX

クールの概要

3週間が1クール
第1週目にオキサリプラチン投与
DAY1～14にTS-1投与

1クール　2クール
1　8　15　22　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓									↓			
②	側管1	ﾃｶﾄﾛﾝ ｱﾛｷｼ 生食	9.9mg 0.75mg 50ml	点滴	15分	↓									↓			
④	側管3	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ 5%ブドウ糖	100mg/㎡ 250ml	点滴	120分													
		TS-1	80～120mg /日	内服	1日2回													

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　時間　90　分

胃 HER-3w

クールの概要

3週間が1クール

1クール　2クール

1　22　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	初回 トラスツズマブ 生食	8mg/kg 250ml	点滴	90分	↓												
①	メイン	2回目以降 トラスツズマブ 生食	6mg/kg 250ml	点滴	90分										↓			

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　時間　45　分

胃 nab-PTX

クールの概要

3週間が1クール
DAY1に投与。DAY8.15が休薬

1クール　2クール
1　8　15　22　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓									↓			
②	側管1	ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 生食	6.6mg 50ml	点滴	15分	↓									↓			
③	側管2	nabPTX 生食	260mg/m2 100ml	点滴	30分	↓									↓			
④																		

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　時間 45分

胃 nab-PTX-w

クールの概要

4週間で1クール
第1,8,15日目に投与。

1クール　　2クール
1　8　15　21　　1　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓		↓		↓					↓			
②	側管1	デキサート 生食	6.6mg 50ml	点滴	15分	↓		↓		↓					↓			
③	側管2	nabPTX 生食	100mg/m2 100ml	点滴	30分	↓		↓		↓					↓			

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間：1時間15分

胃PTX-w

クールの概要

4週間が1クール
DAY1･8･15に投与。DAY22が休薬

1クール　2クール
1　8　15　22　29　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓		↓		↓					↓			
②	側管1	デカドロン ポララミン ガスター 生食	9.9mg 5mg 20mg 50ml	点滴	15分	↓		↓		↓					↓			
③	側管2	パクリタキセル 5%ブドウ糖	80mg/m2 250m	点滴	60分	↓		↓		↓					↓			

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　75 分

胃　RAM

クールの概要

2週が1クール

1クール　2クール

1　2　3　4　5　6　7　15　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	ﾒｲﾝ	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓									↓			
②	ﾒｲﾝ	ﾎﾟﾗﾗﾐﾝ5mg 生食	1A 50mL	点滴	15分	↓									↓			
③	ﾒｲﾝ	ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ 生食	8mg/kg 250ml	点滴	60分	↓									↓			

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　　195分

胃　RAM+nabPTX

クールの概要

4週が1クール

1クール　　2クール

1　8　15　22　29　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓		↓		↓					↓			
②	側管1	デキサート ポララミン 生食	6.6mg 5mg 50ml	点滴	15分	↓				↓					↓			
②	側管1	デキサート 生食	6.6mg 50ml	点滴	15分			↓										
④	側管2	ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ 生食	8mg/kg 250ml	点滴	60分	↓				↓					↓			
⑤	側管3	生食	100ml	点滴	60分 (2回目30分以降5分)	↓				↓					↓			
⑥	側管4	nab-PTX 生食	100mg/㎡ 100ml	点滴	30分	↓		↓		↓					↓			

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　　195分

胃　RAM+PTX

クールの概要

4週が1クール

1クール　　2クール

1　8　15　22　29　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓		↓		↓					↓			
②	側管1	ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ ガスター ボララミン 生食	9.9mg 20mg 5mg 50mL	点滴	15分	↓		↓		↓					↓			
②	側管2	ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ 生食	8mg/kg 250ml	点滴	60分	↓				↓					↓			
④	側管3	生食	100ml	点滴	60分 (2回目30分以降5分)	↓				↓					↓			
⑤	側管4	パクリタキセル 5%ブドウ糖	80mg/㎡ 250ml	点滴	60分	↓		↓		↓					↓			

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　　時間　　分

胃 S1+CDDP

クールの概要

35日間が1クール
TS-1はDAY1から21まで内服。DAY22～35まで休薬

1クール　1　8　9　10　11　12　21
2クール　36　43　44　45　#

	種別	薬剤	用量	用法	時間	1	8	9	10	11	12	21	36	43	44	45	#
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで		↓								↓		
②	側管1	フィジオ140	500ml	点滴	60分		↓								↓		
③	側管2	プロイメンド 生食	1V 500ml	点滴	60分		↓								↓		
④	側管3	アロキシ デカドロン 生食	0.75mg 9.9mg 50ml	点滴	15分		↓								↓		
⑤	メイン	20%マンニットール	300ml	点滴	30分		↓								↓		
⑥	側管4	シスプラチン 生食	60mg/m2 500ml	点滴	120分		↓								↓		
⑦	メイン	フィジオ140	500ml	点滴	1～2時間		↓								↓		
①	メイン	フィジオ140	1000ml	点滴	8時間		↓									↓	↓
②	メイン	フィジオ140 デカドロン	500ml 6.6mg	点滴	4時間			↓	↓	↓						↓	↓
③	メイン	フィジオ140	500ml	点滴	4時間						↓						
④	メイン	フィジオ140 プリンペラン	1000ml 20mg	点滴	8時間			↓	↓	↓	↓					↓	↓
		TS-1		内服	3投2休												

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　2時間15分

胃　XELOX

クールの概要

3週間で1クール
第1日目に投与。ゼローダは2投1休

1クール　　2クール
1　　8　　15　　22　　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓									↓			
②	側管1	ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ ｱﾛｷｼ 生食	9.9mg 0.75mg 50mL	点滴	15分	↓									↓			
④	側管3	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	130mg/m2 250ml	点滴	120分	↓									↓			
		ゼローダ	2000mg/㎡ 日	内服	2投1休													

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　　時間　　分

胃 XP

クールの概要

3週間が1クール

1クール　1 2 3 4 5 6 15　　2クール　21 22 23 24

	種別	薬剤	用量	用法	時間	1	2	3	4	5	6		15		21	22	23	24
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から CDDP終了まで	↓												
②	側管1	フィジオ140	500ml	点滴	60分	↓												
③	側管2	プロイメンド 生食	1V 500ml	点滴	60分	↓												
④	側管3	アロキシ デキサート 生食	0.75mg 9.9mg 50ml	点滴	15分	↓												
⑤	メイン	マンニットール	300ml	点滴	30分	↓												
⑥	側管4	シスプラチン 生食	80mg/m2 500ml	点滴	120分	↓												
		フィジオ140	500ml	点滴	1～2時間	↓												
		フィジオ140	1000ml	点滴	8時間	↓												
		フィジオ１４０ デキサート	500ml 6.6mg	点滴	4時間		↓	↓	↓									
		フィジオ１４０	500ml	点滴	4時間					↓								
		フィジオ１４０ プリンペラン	1000ml 20mg	点滴	8時間		↓	↓	↓	↓								
		ゼローダ	1回 1000mg/m2 1日2回	内服	２投１休													

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　　時間　　分

胃 XP+HER

クールの概要

3週間が1クール

1クール　1 2 3 4 5 6 15　　2クール　21 22 23 24

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から CDDP終了まで	↓												
②	側管1	フィジオ140	500ml	点滴	60分	↓												
③	側管2	プロイメンド 生食	1V 500ml	点滴	60分	↓												
④	側管3	アロキシ デカドロン 生食	0.75mg 9.9mg 50ml	点滴	15分	↓												
⑤	側管4	トラスツズマブ 生食	8mg/kg 500mL	点滴	90分	↓												
⑥	メイン	マンニットール	300ml	点滴	30分	↓												
⑦	側管5	シスプラチン 生食	80mg/㎡ 500mL	点滴	120分	↓												
		フィジオ140	500mL	点滴	1～2時間	↓												
		フィジオ140	500mL	点滴	8時間	↓												
		フィジオ140 デカドロン	500ml 6.6mg	点滴	4時間		↓	↓	↓									
		フィジオ140	500mL	点滴	4時間					↓								
		フィジオ140 プリンペラン	1000ml 20mg	点滴	8時間		↓	↓	↓	↓								
		ゼローダ	1回 1000mg/m2 1日2回	内服	2投1休													

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 時間30 分

胃-Nivolumab

クールの概要

2週間で1クール
第1日目に投与。

1クール　1
2クール　15　（DAY）

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100mL	点滴	開始から 終了まで	↓									↓			
②	側管1	ニボルマブ 生食	240mg 100mL	点滴	30分	↓									↓			