投与スケジュール

**レジメン名**

1回に要する時間:　　時間　45　分

膵臓　GEM

**クールの概要**

4週が1クール
第1・2・3週目に投与4週目休薬

1クール　　2クール
1　8　15　22　29　(DAY)

| | 種別 | 薬剤 | 用量 | 用法 | 時間 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | メイン | 生食 | 100ml | 点滴 | 開始から終了まで | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | ↓ | | | |
| ② | 側管1 | ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ<br>生食 | 6.6mg<br>50ml | 点滴 | 15分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | ↓ | | | |
| ③ | 側管2 | ゲムシタビン<br>生食 | 1000mg/㎡<br>100ml | 点滴 | 30分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | ↓ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

投与スケジュール

**レジメン名**

1回に要する時間:　　時間　　45　分

膵臓　GEM+S1

**クールの概要**

3週間が1クール

第1日、8日目に投与、第15日は休薬

1クール　　2クール

1　　8　　15　　22　　(DAY)

| | 種別 | 薬剤 | 用量 | 用法 | 時間 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | メイン | 生食 | 100ml | 点滴 | 開始から終了まで | ↓ | | | ↓ | | | | | | ↓ | | | |
| ② | 側管1 | ﾃﾞｷｻｰﾄ 生食 | 6.6mg 50ml | 点滴 | 15分 | ↓ | | | ↓ | | | | | | ↓ | | | |
| ③ | 側管2 | ゲムシタビン 生食 | 1000mg/㎡ 100ml | 点滴 | 30分 | ↓ | | | ↓ | | | | | | ↓ | | | |
| | | TS1 | 80～120 mg/日 | 内服 | DAY1～14まで内服 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

投与スケジュール

**レジメン名**

1回に要する時間:　時間　80　分

膵臓　nabPTX+GEM

**クールの概要**

4週が1クール
第1・2・3週目に投与4週目休薬

1クール　2クール
1　8　15　22　29　(DAY)

| | 種別 | 薬剤 | 用量 | 用法 | 時間 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | メイン | 生食 | 100ml | 点滴 | 開始から終了まで | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | ↓ | | | |
| ② | 側管1 | ｶｲﾄﾘﾙﾊﾞｯｸ<br>ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ | 3mg<br>9.9mg | 点滴 | 15分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | ↓ | | | |
| ③ | 側管2 | nabPTX<br>生食 | 125mg/㎡<br>100ml | 点滴 | 30分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | ↓ | | | |
| ④ | 側管3 | 生食 | 50mL | 点滴 | 5分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | ↓ | | | |
| ⑤ | 側管4 | ゲムシタビン<br>生食 | 1000mg/㎡<br>100ml | 点滴 | 30分 | ↓ | | ↓ | | ↓ | | | | | ↓ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |