投与スケジュール

レジメン名

EGPA- IVCY

1回に要する時間: 時間 135分

クールの概要

4週間が1クール
第1日目に投与。

1クール　2クール
1　8　15　29　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓									↓			
②	側管1	ｶｲﾄﾘﾙ注ﾊﾞｯｸ デカドロン	3mg 9.9mg	点滴	15分	↓									↓			
③	側管2	ｼｸﾛﾎｽﾌｧﾐﾄﾞ 生食	750mg/m2 500ml	点滴	2時間	↓									↓			

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　2　時間　00分

RA レミケード

クールの概要

初回投与後2週、6週、
以後8週間に1回投与

1クール2クール　3クー　4クール
1　15　43　99　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①		インフリキシマブ 生食	3mg/kg 250ml	点滴静注	下記	↓		↓				↓			↓			
②		生食	10mL/V	溶解用														

投与スケジュール

レジメン名

乾癬　Infliximab

1回に要する時間:　　時　間分

クールの概要

初回投与後、2週後、6週後に投与
その後、6～8週間に1回投与

1クール

1　2　3　4　5　6　7　15　43
(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓									↓		↓	
②	側管1	インフリキシマブ 生食	5mg/kg 250ml	点滴	120分	↓									↓		↓	

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　時間 75分

血管肉腫-DTX-w

クールの概要

4週間で1クール
第1、8、15日目に投与、21が休薬

1クール　　2クール
1　8　15　21　　1　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓		↓		↓					↓			
②	側管1	デキサート 生食	6.6mg 50ml	点滴	15分	↓		↓		↓					↓			
③	側管2	ドセタキセル 5%ブドウ糖	25mg/m2 250ml	点滴	60分	↓		↓		↓					↓			