		レジメン名									1回に要する時間: 75 分									
	食道 DTX																			
ールの概要								Δ	5	6	7			<mark>2ク-</mark> 22	-ル (D	AY)				
3週間が1クール														22	(D	Λ1)				
£ Dıl İ	带女 !	ᄪᆖ	田汁	吐甲	, '															
					╁.															
メイン	生食	100mL	点滴	終了まで	↓									1						
測管1	デキサート 生食	6.6mg 50mL	点滴	15分	↓									1						
則管2	ドセタキセル 5%ブドウ糖	70mg/m ² 250mL	点滴	60分	1									1						
·	種別 メイン 則管1	種別 薬剤 ゲイン 生食 デキサート 生食 デキサート 生食	種別 薬剤 用量 メイン 生食 100mL 引管1 デキサート 6.6mg 50mL ドセタキセル 70mg/㎡	種別 薬剤 用量 用法 メイン 生食 100mL 点滴 『デキサート 6.6mg 点滴 生食 50mL 点滴	種別 薬剤 用量 用法 時間 メイン 生食 100mL 点滴 開始から 終了まで 測管1 デキサート 6.6mg 点滴 15分 生食 50mL に適 15分 で 15分	3週間が1クール 種別 薬剤 用量 用法 時間	3週間が1クール ■	種別 薬剤 用量 用法 時間 ゲイン 生食 100mL 点滴 開始から 終了まで ↓	3週間が1クール ■	3週間が1クール 種別 薬剤 用量 用法 時間	3週間が1クール ■	3週間が1クール 種別 薬剤 用量 用法 時間								

レジメン名 食道 FP9906 ールの概要 7週間が1クール								1回に要する時間:							時間					宁
								<mark>√</mark> 3 10 ∎	4 11	5 12	6 7 2 13 14				<mark>2ク</mark> 36	ال 7 (DAY)				
	種別	薬剤	用量	用法	時間]														
1	メイン	生食	100ml	点滴	開始から 終了まで	ļ									↓					
2	側管1	プロイメンド 生食	150mg 500ml	点滴	60分	ļ									1					
3	側管2	フィジオ140	500ml	点滴	2時間	1									1					
4)	側管3	テ゛キサート	9.9mg	点滴	15分															
(5)	側管4	20%マンニットー ル	300ml	点滴	30分	1									Ţ					
6	側管5	シスプラチン 生食	40mg/m ² 500ml	点滴	120分	ļ									1					
7	側管6	フルオロウラシル 生食	400mg/ m 500ml	点滴	24時間	ļ	1	1	1	1					↓	Ţ	1	↓	Ţ	
	メイン	フィジオ140	500ml	点滴	2時間	1									Ţ					
	メイン	フィジオ140	1000ml	点滴	12時間	1									1					
	メイン	フィシ オ140 デキサート プリンペラン	500ml 6.6mg 10mg	点滴	6時間		1	1	1							1	1	1		
	メイン	フィシ゛オ140 プリンペラン	500ml 10mg	点滴	6時間		1	1	1							1	1	↓		
	メイン	フィジオ140	1000ml	点滴	12時間					\downarrow	↓								Ţ	I
		radiation							[Day [*]	1∼ 5	5, 8	~ 12	2, 1	5~	19				

レジメン名 1回に要する時間: 時間 分 食道 FP9907 クールの概要 1クール 1 2 3 4 5 6 7 (DAY) 29 4週間が1クール 種別 薬剤 用量用法 時間 開始から ① メイン 点滴 1 1 生食 100ml 終了まで プロイメンド 150mg 2 1 1 側管1 点滴 60分 500ml 生食 3 フィジオ140 500ml 2時間 1 1 側管2 点滴 デカドロン 9.9mg 点滴 15分 4 側管3 20%マンニットー 1 (5) 側管4 300ml 点滴 30分 ル シスプラチン 80 mg/m6 側管5 点滴 120分 1 1 生食 500ml 800mg/ 5FU 1 1 1 1 1 1 7 1 1 側管6 点滴 24時間 1 1 生食 500ml フィジオ140 500ml 2時間 1 1 メイン 点滴 1 1 メイン フィジオ140 1000ml 点滴 12時間 フィシオ140 500ml 1 1 1 1 1 1 メイン デカドロン 6.6mg 点滴 6時間 プリンヘ・ラン 10mg 1 フィジオ140 1000ml 1 1 1 1 1 1 1 メイン 点滴 12時間 フィジオ140 500ml 1 1 1 メイン 点滴 6時間 1 1 1 プリンペラン 10mg フィジオ140 1000ml 1 1 1 1 点滴 12時間 プリンペラン 20mg

レジメン名 1回に要する時間: 1時間 30分 食道 PTX-w 1クール **クールの概要** 7週間が1クール 第1·2·3·4·5·6週日に投与、7週目は 1クール 2クール 1 8 15 22 29 35 50 (DAY) 休薬 ____ □ ┃種別 ┃ 薬剤 ┃ 用量 ┃ 用法 ┃ 時間 開始から ① メイン 点滴 \downarrow 1 1 1 ļ 生食 1 100ml 終了まで デキサート 9.9mg ポララミン 5mg ② 側管1 1 1 1 点滴 15分 1 1 1 1 ガスター20mg 20mg 生食 50ml パクリタキセル 100mg/㎡ ③ 側管2 1 1 1 1 1 1 1 点滴 60分 5%ブドウ糖 250ml