

[illegible]

投与スケジュール

レジメン名

食道 FP9906

1回に要する時間: 時間 分

クールの概要

7週間が1クール

1クール

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

2クール

36 (DAY)

[illegible]

レジメン名		1回に要する時間：		時間		分																		
食道 FP9907																								
クールの概要		1クール							2クール															
4週間が1クール		1 2 3 4 5 6 7							29 (DAY)															
種別	薬剤	用量	用法	時間																				
① メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓										↓									
② 側管1	プロイメンド 生食	150mg 500ml	点滴	60分	↓										↓									
③ 側管2	フィジオ140	500ml	点滴	2時間	↓										↓									
④ 側管3	デカドロン	9.9mg	点滴	15分	↓																			
⑤ 側管4	20%マンニトール	300ml	点滴	30分	↓										↓									
⑥ 側管5	シスプラチン 生食	80mg/m ² 500ml	点滴	120分	↓										↓									
⑦ 側管6	5FU 生食	800mg/ m ² 500ml	点滴	24時間	↓	↓	↓	↓	↓						↓	↓	↓	↓	↓					
メイン	フィジオ140	500ml	点滴	2時間	↓										↓									
メイン	フィジオ140	1000ml	点滴	12時間	↓										↓									
メイン	フィジオ140 デカドロン プリンペラン	500ml 6.6mg 10mg	点滴	6時間		↓	↓	↓								↓	↓	↓						
メイン	フィジオ140	1000ml	点滴	12時間		↓	↓	↓	↓	↓						↓	↓	↓	↓	↓				
メイン	フィジオ140 プリンペラン	500ml 10mg	点滴	6時間		↓	↓	↓								↓	↓	↓						
メイン	フィジオ140 プリンペラン	1000ml 20mg	点滴	12時間					↓	↓												↓	↓	

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 1時間

30分

食道 PTX-w

クールの概要

7週間が1クール

第1・2・3・4・5・6週目に投与、7週目は
休薬

1クール

1 8 15 22 29 35

2クール

50 (DAY)

[illegible]

投与スケジュール

レジメン名					1回に要する時間：		時間	分											
食道 DCF																			
クールの概要					1クール		2クール												
3週間が1クール					1 2 3 4 5 14		22 (DAY)												
	種別	薬剤	用量	用法	時間														
①	メイン	生食	100ml	点滴	CDDP 終了まで	↓										↓			
②	側管1	プロイメンド 生食	1V 500ml	点滴	60分	↓										↓			
③	側管2	デキサート パロノセトロン 生食	9.9mg 0.75mg 50ml	点滴	15分	↓										↓			
④	側管3	ドセタキセル 5%ブドウ糖	70mg/m2 250ml	点滴	60分	↓										↓			
⑤	メイン	マンニトール	300ml	点滴	60分	↓										↓			
⑥	側管4	シスプラチン 生食	70mg/m2 500ml	点滴	120分	↓										↓			
⑦	側管5	フルオロウラシル 生食	750mg/m2 500ml	点滴	24時間	↓	↓	↓	↓	↓						↓	↓	↓	↓
		フィジオ140	500ml	点滴	3時間	↓										↓			
		フィジオ140	1000ml	点滴	16時間	↓										↓			
		(Day2の10時までキープして投与)																	
		フィジオ140 デキサート プリンペラン	2000ml 6.6mg 20mg	点滴	24時間		↓	↓	↓								↓	↓	↓
		(1日4本の輸液を24時間キープして投与)																	
		フィジオ140 プリンペラン	2000ml 20mg	点滴	24時間					↓	↓								
		(1日4本の輸液を24時間キープして投与)																	

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間: 75 分

食道 DTX+NDP

クールの概要

1クール

2クール

15 (DAY)

14週間が1クール

[illegible]

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間: 時間 分

食道 FP9907-3w術前

クールの概要

1クール

2クール

1 2 3 4 5 6 7

21 (DAY)

4週間が1クール

[illegible]

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間: 5 時間 20 分

食道 Nivolumab+FP

クールの概要

1クール

2クール

4週間が1クール

1 2 3 4 5 6 7 15

29

[illegible]

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 時間30 分

食道-Nivolumab-4w

クールの概要

4週間で1クール
第1日目に投与。

1クール

2クール

(DAY)

[illegible]

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間: 5 時間 20 分

食道 Pembrolizumab+FP

シスプラチンは最大6コースまで

クールの概要

1クール

2クール

3週間が1クール

1 2 3 4 5 6 7

22

[illegible]

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間: 時間 分

食道 FP9907-3w術前

クールの概要

1クール

2クール

1 2 3 4 5 6 7

21 (DAY)

3週間が1クール

[illegible]

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 時間90 分

食道-Nivolumab+Ipilimumab

クールの概要

6週間で1クール
第1、22日目に投与。

1クール

2クール

(DAY)

1

22

43

[illegible]

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 時間30 分

食道-Nivolumab-2w

クールの概要

2週間で1クール
第1日目に投与。

1クール

2クール

(DAY)

[illegible]