

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 2時間15分

胃 CapeOX(XELOX)

クールの概要

3週間で1クール
第1日目に投与。ゼローダは2投1休

1クール

1

15

2クール

22 (DAY)

投与スケジュール

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間: 1時間 45 分

胃 CPT11-2W

クールの概要

5週間が1クール
DAY1・15に投与。DAY8・22・29は休薬

1クール
1 8 15 22 29

2クール
36 (DAY)

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 1時間 45分

胃 CPT11-w

クールの概要

5週間が1クール
DAY1:8:15:22に投与。DAY29は休薬

1クール
1 8 15 22 29

2クール
36 (DAY)

投与スケジュール

レジメン名						1回に要する時間:					時間	
胃 DCS						1クール					分	
クールの概要						1	2	3	4	5	14	28
4週間が1クール						29	2クール (DAY)					
	種別	薬剤	用量	用法	時間							
①	メイン	生食	100ml	点滴	CDDP 終了まで	↓						↓
②	側管1	フィジオ140	500ml	点滴	60分	↓						↓
③	側管2	プロイメント 生食	1V 500ml	点滴	60分	↓						↓
④	側管3	デキサート アロキシ 生食	9.9mg 0.75mg 50ml	点滴	15分	↓						↓
⑤	側管4	ドセタキセル 5%ブドウ糖	40mg/m2 250ml	点滴	60分	↓						↓
⑥	メイン	マンニットール	300ml	点滴	30分	↓						↓
⑦	側管5	シスプラチナ 生食	60mg/m2 500ml	点滴	120分	↓						↓
		フィジオ140	500ml	点滴	1~2時間	↓						↓ ↓ ↓
		フィジオ140	1000ml	点滴	8時間	↓						↓ ↓ ↓
		フィジオ140 デキサート	500ml 6.6mg	点滴	4時間		↓	↓	↓			↓ ↓ ↓
		フィジオ140	500ml	点滴	4時間					↓		
		フィジオ140 プリンペラン	1000ml 20mg	点滴	8時間		↓	↓	↓	↓		
		TS-1	80mg/m2	内服	2投2休	■	■	■	■	■	■	■

投与スケジュール


レジメン名

1回に要する時間: 1時間30分

DS

クールの概要

3週間が1クール。DAY1に投与。
TS-1はDAY1から14まで投与。3週目休薬



投与スケジュール

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 2 時間 15分

胃 G-SOX

クールの概要

3週間が1ケール
第1週目にオキサリプラチン投与
DAY1~14にTS-1投与

1クール
1 8 15

2クール
22 (DAY)

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間: 時間 90 分

胃 HER-3w

クールの概要

1クール

2ケール
22 (DAY)

3回間が1クール

投与スケジュール

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 時間 45分

胃 nab-PTX-w

クールの概要

4週間で1クール
第1,8,15日に投与。

1クール
1 8 15 21

2クール
1 (DAY)

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間: 1時間15分

胃PTX-w

クールの概要

4週間が1クール
DAY1・8・15に投与。DAY22が休薬

1クール
1 8 15 22

2ケール
29 (DAY)

投与スケジュール


レジメン名

1回に要する時間: 75 分

置 RAM

クールの概要

2調が1クール



投与スケジュール

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間: 195分

胃 RAM+PTX

クールの概要

4週が1クール

1クール
1 8 15 22

2クール
29 (DAY)

投与スケジュール

レジメン名	1回に要する時間:							時間	分
胃 S1+CDDP	1クール							2クール	
クールの概要	1 8 9 10 11 12 21							36 43 44 45 #	
35日間が1クール TS-1はDAY1から21まで内服。DAY22～35まで 休薬									
	種別	薬剤	用量	用法	時間				
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から 終了まで		↓		
②	側管1	フィジオ140	500ml	点滴	60分		↓		
③	側管2	プロイメンド 生食	1V 500ml	点滴	60分		↓		
④	側管3	アロキシ デカドロン 生食	0.75mg 9.9mg 50ml	点滴	15分		↓		
⑤	メイン	20%マンニットール	300ml	点滴	30分		↓		
⑥	側管4	シスプラチニン 生食	60mg/m ² 500ml	点滴	120分		↓		
⑦	メイン	フィジオ140	500ml	点滴	1～2時間		↓		
①	メイン	フィジオ140	1000ml	点滴	8時間		↓		
②	メイン	フィジオ140 デカドロン	500ml 6.6mg	点滴	4時間		↓	↓	↓
③	メイン	フィジオ140	500ml	点滴	4時間			↓	
④	メイン	フィジオ140 プリンペラン	1000ml 20mg	点滴	8時間		↓	↓	↓
		TS-1		内服	3投2休				

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 2時間15分

胃 XELOX

クールの概要

3週間で1ケール
第1日目に投与。ゼローダは2投1休

1ケール

2ケール
22 (DAY)

投与スケジュール

レジメン名		1回に要する時間:						時間		分
胃 XP		1クール						2クール		
クールの概要		1 2 3 4 5 6 15						21 22 23 24		
3週間が1クール										
①	種別	薬剤	用量	用法	時間					
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から CDDP終了まで	↓				
②	側管1	フィジオ140	500ml	点滴	60分	↓				
③	側管2	プロイメント 生食	1V 500ml	点滴	60分	↓				
④	側管3	アロキシ デキサート 生食	0.75mg 9.9mg 50ml	点滴	15分	↓				
⑤	メイン	マンニットール	300ml	点滴	30分	↓				
⑥	側管4	シスプラチニン 生食	80mg/m ² 500ml	点滴	120分	↓				
		フィジオ140	500ml	点滴	1~2時間	↓				
		フィジオ140	1000ml	点滴	8時間	↓				
		フィジオ140 デキサート	500ml 6.6mg	点滴	4時間		↓	↓	↓	
		フィジオ140	500ml	点滴	4時間				↓	
		フィジオ140 プリンペラン	1000ml 20mg	点滴	8時間		↓	↓	↓	↓
		ゼローダ	1回 1000mg/m ² 1日2回	内服	2投1休					

投与スケジュール

レジメン名 胃 XP+HER						1回に要する時間:	時間	分
クールの概要						1クール	2クール	
3週間が1クール						1 2 3 4 5 6 15	21 22 23 24	
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から CDDP終了まで	↓		
②	側管1	フィジオ140	500ml	点滴	60分	↓		
③	側管2	プロイメント 生食	1V 500ml	点滴	60分	↓		
④	側管3	アロキシ デカドロン 生食	0.75mg 9.9mg 50ml	点滴	15分	↓		
⑤	側管4	トラスツズマブ 生食	8mg/kg 500mL	点滴	90分	↓		
⑥	メイン	マンニットール	300ml	点滴	30分	↓		
⑦	側管5	シスプラチニ 生食	80mg/m ² 500mL	点滴	120分	↓		
		フィジオ140	500mL	点滴	1~2時間	↓		
		フィジオ140	500mL	点滴	8時間	↓		
		フィジオ140 デカドロン	500ml 6.6mg	点滴	4時間	↓	↓	↓
		フィジオ140	500mL	点滴	4時間			↓
		フィジオ140 プリンペラン	1000ml 20mg	点滴	8時間	↓	↓	↓
		ゼローダ	1回 1000mg/m ² 1日2回	内服	2投1休			

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 時間30 分

胃-Nivolumab

クールの概要

2週間で1クール
第1日目に投与。

1クール

1

2クール

15 (DAY)

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:1時間 15分

胃 DS-術後


クールの概要

3週間が1クール。DAY1に投与。
TS-1はDAY1から14まで投与。3週目休薬。

1クール 2クール 3クール (DAY)
1 15 22 36 1



投与スケジュール

レジメン名		1回に要する時間: 時間 分										
胃 mFOLFOX6+Her												
クールの概要												
2週間で1クール 第1日目に投与												
												
順位	種別	薬剤	用量	用法	時間	1	2	15	16	22	29	43
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から了時まで	↓		↓		↓	↓	
②	側管1	トラスツズマブ 生食	8mg/kg 250mL	点滴	90分	↓						
②	側管1	トラスツズマブ 生食	6mg/kg 250mL	点滴	60分					↓		↓
③	側管2	パロノセトロン デキサート	0.75mg 9.9mg	点滴	15分	↓		↓		↓		↓
④	側管3	オキサリプラチニ 5%ブドウ糖 (⑤と同時投与)	85mg/m2 250ml	点滴	120分	↓		↓		↓		↓
⑤	側管3	レボホリナート 5%ブドウ糖 (④と同時投与)	200mg/m2 250ml	点滴	120分	↓		↓		↓		↓
⑥	側管4	フルオロウラシル 生食	400mg/m2 50ml	点滴	5分	↓		↓		↓		↓
⑦	メイン	フルオロウラシル 生食 ヘパリン	2400mg/m2 2000単位	シュアフューザー使用	46時間	■	■	■	■	■	■	■

投与スケジュール

レジメン名

置 mFOLFOX6

1回に要する時間: 時間 分

クールの概要

2週間で1ケール
第1日目に投与

1クール

1 2 3

2クール

1 (day)

投与スケジュール

レジメン名


1回に要する時間: 3 時間 45分

胃 SOX+Nivolumab

クールの概要

3調間が1クール

第1週目にオキサリプラチン投与
DAY1~14にTS-1投与



投与スケジュール

レジメン名		1回に要する時間: 時間 分										
胃 SP												
クールの概要		1クール 35日間が1クール TS-1はDAY1から21まで内服。DAY22～35まで 休薬										
胃 SP		1クール 1 8 9 10 11 12 21 28 35 2クール 1 8										
順序	種別	薬剤	用量	用法	時間	1	2	3	4	5	6	7
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から 終了まで	↓						↓
②	側管1	フィジオ140	500ml	点滴	60分	↓						↓
④	側管3	パロノセトロンパック デキサート アロカリス	0.75mg/50mL 9.9mg 235mg	点滴	30分	↓						↓
⑤	メイン	20%マンニットール	300ml	点滴	30分	↓						↓
⑥	側管4	シスプラチニン 生食	60mg/m ² 500ml	点滴	120分	↓						↓
⑦	メイン	フィジオ140	500ml	点滴	1～2時間	↓						↓
①	メイン	フィジオ140	1000ml	点滴	16時間	↓						↓
②	メイン	フィジオ140 デキサート	500ml 6.6mg	点滴	8時間		↓	↓	↓			↓
③	メイン	フィジオ140	500ml	点滴	8時間				↓			
④	メイン	フィジオ140 プリンペラン	1000ml 20mg	点滴	16時間		↓	↓	↓	↓		↓
		S-1		内服	3投2休							

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 1時間 30 分

胃 TAS102+RAM

クールの概要

4週間が1ケール
ロンサーフは5日間投与2日休薬
5日間投与2日休薬
2週間休薬



投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間： 2時間 分

胃 Tmab+Deruxtecan

クールの概要

3週間が1クール

3週間が1ヶ月 第1日目に投与



投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間: 3 時間 45分

胃 XELOX+Nivolumab

クールの概要

3週間が1クール
第1週目にオキサリプラチン投与
DAY1～14にTS-1投与

