投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　1　時間　15　分

前立腺　DTX-3w

クールの概要

3週が1クール
第1日目に投与

1クール　1　2　3　4　5　6　7
2クール　22　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓									↓			
②	側管1	ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 生食	6.6mg 50ml	点滴	15分	↓									↓			
③	側管2	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75mg/㎡ 250ml	点滴	60分	↓									↓			

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　1　時間　15　分

前立腺　DTX-3w+PSL

クールの概要

3週が1クール
第1日目に投与

1クール　2クール

1　2　3　4　5　6　7　22　(DAY)

	種別	薬剤	用量	用法	時間													
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓									↓			
②	側管1	ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ 生食	6.6mg 50ml	点滴	15分	↓									↓			
③	側管2	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75mg/㎡ 250ml	点滴	60分	↓									↓			
		プレドニゾロン	1回5mg 1日2回	内服	連日													

投与スケジュール

レジメン名

1回に要する時間:　　時間　　分

尿路上皮　GEM＋CDDP

クールの概要

4週が1クール
GEM1日目、8、15に投与
CDDP2日目に投与

1クール　　2ク
1　2　3　4　5　6　7　8　15　29

	種別	薬剤	用量	用法	時間	1	2	3	4	5	6	7	8		15			29
①	メイン	生食	100ml	点滴	開始から終了まで	↓	↓						↓		↓			↓
②	側管1	フィジオ140	500ml	点滴	60分		↓											
③	側管2	プロイメンド 生食	150mg 500ml	点滴	60分		↓											
④	側管3	ﾃｷｻｰﾄ ｱﾛｷｼ 生食	9.9mg 0.75mg 50ml	点滴	15分		↓											
⑤	側管1	ﾃﾞｷｻｰﾄ 生食	6.6mg 50ml	点滴	15分	↓							↓		↓			↓
⑥	側管2	ゲムシタビン 生食	1000mg/㎡ 100ml	点滴	30分	↓							↓		↓			↓
⑦	側管4	20%マンニトール	300mL	点滴	30分		↓											
⑧	側管5	シスプラチン 生食	70mg/㎡ 500ml	点滴	120分		↓											
	メイン	フィジオ140	500ml	点滴	1～2時間		↓											
	メイン	フィジオ140	1000ml	点滴	8時間		↓											
	メイン	フィジオ140 デキサート	500ml 6.6mg	点滴	4時間			↓	↓	↓								
	メイン	フィジオ140	500ml	点滴	4時間						↓							
	メイン	フィジオ140 プリンペラン	1000ml 20mg	点滴	8時間			↓	↓	↓	↓							